

## Hipotermia - Recomendações

- Manter a temperatura sala de parto em pelo menos 26°C
- Evitar a hipotermia materna, condição essa propiciada pela anestesia espinal, além das condições ambientais
- Maximizar o cuidado térmico ao RNPT, usando fonte de calor radiante, saco plástico e touca. Evitar o uso de gases frios na reanimação.
- Transportar o RN à unidade neonatal em incubadoras pré-aquecidas, com saco plástico e touca e, de preferência, com gases aquecidos se houver necessidade de suporte ventilatório.

## Bibliografia:

1. McCall EM, Alderdice F, Halliday HL, Jenkins JG, Vohra S. Interventions to prevent hypothermia at birth in preterm and/or low birthweight infants. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010;(3):CD004210.
2. Perlman J, Kattwinkel J, Wyllie J, Guinsburg R, Velaphi S; Nalini Singhal for the Neonatal ILCOR Task Force Group. Neonatal resuscitation: In pursuit of evidence gaps in knowledge. *Resuscitation.* 2012; 83:545-50.
3. Perlman JM, Wyllie J, Kattwinkel J, Atkins DL, Chameides L, Goldsmith JP, et al. Part 11: neonatal resuscitation: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. *Circulation* 2010;122(16 Suppl 2):S516-38.
4. Watkinson M. Temperature control of premature infants in the delivery room. *Clin Perinatol* 2006;33:43-53, vi.